

Piégeage de printemps du

FRELON ASIATIQUE



Pourquoi piéger les fondatrices de frelons asiatiques (gynes) au printemps ?

Au sortir de l'hiver, tous les frelons asiatiques visibles sont des gynes, chacune cherche à fonder un nid primaire. Lorsque les 1^{ères} ouvrières naissent, que le nid primaire (de la taille d'une balle de tennis) devient trop petit, un nid secondaire est créé à proximité : il grossira jusqu'à 80 cm de diamètre et contiendra des milliers d'individus. Piéger les gynes au printemps (tout comme localiser et détruire les nids primaires) est une action simple et efficace pour limiter les nids secondaires et protéger le reste de la biodiversité.

Piéger ? Oui mais de façon sélective !

- Les couvercles à trous distribués par la commune sont adaptés à la taille des gynes : les insectes plus gros ne peuvent pas rentrer, les plus petits peuvent ressortir.
- Les pièges doivent être anti-noyade : l'appât doit imbiber une éponge ou de la sciure et non être versé directement dans le bocal afin d'éviter la mortalité inutile d'insectes non ciblés.

Questions & contact

Service Transition écologique
etterbeek.durable@etterbeek.brussels
02 627 27 85

**Vous venez d'obtenir un couvercle
piège à frelons asiatiques ?**
Félicitations et merci pour votre implication !



Période de piégeage

Installez le piège uniquement pendant la période déterminée par Bruxelles Environnement et communiquée par la commune.

Installation du piège

- Utilisez un pot en verre propre, adapté au format du piège (confiture, mayonnaise, miel, etc.) .
- Placez au fond du pot un morceau d'éponge ou de la sciure de bois.
- Imbibez l'éponge ou la sciure avec l'appât : 1/3 de bière, 1/3 de vin blanc et 1/3 de grenadine.
- Vissez le piège sur le pot.
- Placez le piège à l'horizontale, dans un endroit calme, ensoleillé et éloigné des portes, fenêtres, ventilations, etc.

Utilisation et entretien du piège

- Contrôlez le piège au moins 2 fois par semaine.
- Renouvelez l'appât au moins 1 fois par semaine, plus souvent par temps chaud.

Vous avez capturé un insecte ?

- Uniquement un frelon asiatique : placez le pot au congélateur (-18°C) pendant quelques heures, puis jetez le frelon à la poubelle. Attention, le dard d'un frelon mort peut encore piquer !
- Des insectes non ciblés en plus d'un frelon asiatique : placez le pot au réfrigérateur (4°C) au moins 1h pour les endormir. Libérez les insectes non ciblés et replacez le pot au congélateur.

Enregistrement des captures

Afin de nous permettre de suivre l'impact de la campagne de piégeage, merci de remplir ce formulaire pour chaque frelon capturé :

